

# Mecânica Quântica – Teste 1 – Exemplo

Curso de Engenharia Física Tecnológica – 2007/2008

Duração 1h30m

## I (4 valores)

Para cada uma das questões seguintes diga se são verdadeiras ou falsas. Justifique numa linha a sua resposta, isto é, indique a razão sem fazer contas.

1. O operador  $xp_x$  é hermitico.
2. Considere uma partícula numa caixa de largura  $2a$  centrada em  $x = 0$  ( $V = 0, |x| < a$ ,  $V = \infty, |x| > a$ ). Sejam  $\psi_n(x), n = 1, 2, 3, \dots$  as funções próprias do operador Hamiltoniano. Então
$$x_{n+1,n} = \int_{-a}^a dx x \psi_{n+1}^*(x) \psi_n(x) = 0$$
3. As funções próprias do operador Hamiltoniano para o problema da partícula na caixa ( $V = 0, |x| < a, V = \infty, |x| > a$ ), são funções próprias simultâneas dos operadores momento linear e Paridade.
4. Em problemas a uma dimensão não há estados degenerados do operador Hamiltoniano para funções de onda normalizáveis.
5. Para qualquer estado  $|n\rangle$  do oscilador hamónico temos  $\langle n+1|p|n\rangle \neq 0$ .

## II (8 valores)

Seja uma partícula numa caixa descrita pelo potencial  $V = 0$  para  $0 < x < a$  e  $V = \infty$  para  $x < 0$  e  $x > a$ .

1. Suponha que a partícula no instante  $t = 0$  se encontra no estado

$$\psi(x, 0) = A u_1(x) + B u_2(x).$$

onde  $A$  e  $B$  são constantes reais. Sabe-se que uma medida da energia do sistema dá o valor  $E_2$  com probabilidade  $1/2$ . Determine  $|A|$  e  $|B|$ .

2. Sabendo que a constante  $A$  é positiva e que no instante  $t = 0$  a probabilidade de encontrar a partícula no intervalo  $[0, a/2]$  é menor que a probabilidade de a encontrar no intervalo  $[a/2, a]$ , determine o sinal da constante  $B$ . **Nota:** Se pensar um pouco não precisa de fazer contas.
3. Determine os valores de  $x$  para os quais a densidade de probabilidade  $P(x) = |\psi(x, 0)|^2$  se anula. **Nota:** Se não determinou o sinal de  $B$  na alínea anterior use um sinal à sua escolha.
4. Que acontece para  $t > 0$  aos pontos onde  $P(x, t)$  se anula, mantém-se ou variam? Justifique a resposta.

## III (8 valores)

Considere o seguinte potencial a uma dimensão:

$$V(x) = \begin{cases} \infty & x < 0 \\ -\frac{\hbar^2 \lambda}{2m a} \delta(x - a) & x > 0 \end{cases}$$

1. Considere os estados de difusão nesse potencial, isto é, admita que  $E > 0$  e que para  $x > a$  a função de onda é dada por

$$u_{II}(x) = e^{-ikx} + Re^{ikx}$$

Calcule  $R$  e  $|R|^2$ . Comente os resultados.

2. Calcule o fluxo  $j_I(x)$  para  $0 < x < a$  e  $j_{II}(x)$  para  $x > a$  e verifique que o fluxo é conservado.
3. Considere agora o problema dos estados ligados, isto é,  $E < 0$ . Determine a equação para os estados ligados.
4. Verifique que essa equação podia ter sido deduzida olhando para os pólos do factor de reflexão  $R$  (zeros do denominador).
5. Haverá sempre estado(s) ligado(s)? Para responder a esta questão faça uma análise gráfica da equação dos estados ligados, justificando se existe(m) sempre estado(s) ligado(s) ou se é preciso impor alguma condição em  $\lambda$  para que isso aconteça.

### Formulário

- **Poço de potencial infinito**

$V = 0$  para  $0 < x < a$  e  $V = \infty$  para  $x < 0$  e  $x > a$ . As funções próprias do operador hamiltoniano  $H$  ( i.e. da energia) são:

$$u_n(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin\left(\frac{n\pi}{a}x\right) \quad , \quad E_n = \frac{\pi^2 \hbar^2}{2ma^2} n^2 .$$

- **Poço de potencial infinito simétrico**

$V = 0$  para  $-a/2 < x < a/2$  e  $V = \infty$  para  $x < -a/2$  e  $x > a/2$ . As funções próprias do operador hamiltoniano  $H$  ( i.e. da energia) são ( $n = 1, 2, 3, \dots$ ):

$$\begin{aligned} u_n^-(x) &= \sqrt{\frac{2}{a}} \sin\left(\frac{2n\pi}{a}x\right) & E_n^- &= E_0 (2n)^2 \\ u_n^+(x) &= \sqrt{\frac{2}{a}} \cos\left[(2n-1)\frac{\pi}{a}x\right] & E_n^+ &= E_0 (2n-1)^2 \end{aligned} \quad E_0 = \frac{\pi^2 \hbar^2}{2ma^2} .$$

- **Primitivas para os problemas do poço infinito**

$$\int dy \sin^2(y) = \frac{1}{2}y - \frac{1}{4}\sin(2y)$$

$$\int dy \sin(ny) \sin(my) = \frac{1}{2(m-n)} \sin[y(m-n)] - \frac{1}{2(m+n)} \sin[y(m+n)] \quad ; \quad m \neq n$$

$$\int dy y \sin^2(ny) = \frac{y^2}{4} - \frac{\sin(2ny)y}{4n} - \frac{\cos(2ny)}{8n^2}$$

$$\int dy y \sin(ny) \sin(my) = \frac{1}{2} \left( \frac{\cos((m-n)y)}{(m-n)^2} - \frac{\cos((m+n)y)}{(m+n)^2} + \frac{y \sin((m-n)y)}{m-n} - \frac{y \sin((m+n)y)}{m+n} \right) \quad ; \quad m \neq n$$

- **Oscilador harmónico: Polinómios de Hermite**

As funções próprias são

$$u_n(x) = \left(\frac{m\omega}{\pi\hbar}\right)^{1/4} \frac{1}{\sqrt{2^n n!}} H_n(y) e^{-y^2/2}$$

onde  $y = \sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}}x$  e os primeiros polinómios de Hermite são:

$$\begin{aligned} H_0 &= 1 \\ H_1 &= 2x \\ H_2 &= 4x^2 - 2 \\ H_3 &= 8x^3 - 12x \\ H_4 &= 16x^4 - 48x^2 + 12 \end{aligned}$$

As energias são dadas por

$$E_n = \left(n + \frac{1}{2}\right) \hbar\omega \quad n = 0, 1, 2, 3, \dots$$

- **Oscilador harmónico: Operadores  $A$  e  $A^+$**

$$H = \frac{p^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2 x^2 = \hbar\omega \left(A^+ A + \frac{1}{2}\right)$$

onde

$$A = \sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}}x + i\frac{p}{\sqrt{2m\omega\hbar}}, \quad A^+ = \sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}}x - i\frac{p}{\sqrt{2m\omega\hbar}}$$

com

$$[A, A^+] = 1$$

Os estados correctamente normalizados são

$$|n\rangle = \frac{1}{\sqrt{n!}} (A^+)^n |0\rangle$$

com  $A|0\rangle = 0$ .