

Teste Exemplo 2014-2015
(1º Teste: 9 de Novembro de 2013 – 9h30)
Duração do teste: 1h30

I (4 valores)

Para cada uma das afirmações seguintes diga se são verdadeiras ou falsas. Justifique numa linha a sua resposta, isto é, indique a *razão* sem fazer contas.

1. Se A e B forem operadores hermíticos, então o operador $C = (A + B)^2$ também é hermítico.
2. Considere uma partícula numa caixa de largura $2a$ centrada em $x = 0$ ($V = 0, |x| < a, V = \infty, |x| > a$). Sejam $\psi_n(x), n = 1, 2, 3, \dots$ as funções próprias do operador Hamiltoniano. Então

$$x_{n+2,n} = \int_{-a}^a dx x \psi_{n+2}^*(x) \psi_n(x) = 0$$

3. Considere um poço de potencial a uma dimensão, isto é, $V = -V_0, -a < x < a$ e $V = 0, x > |a|$. Se tivermos

$$0 < \lambda < \frac{\pi^2}{4}$$

onde $\lambda = 2mV_0 a^2/\hbar^2$, então existe um só estado ligado para este potencial.

4. Para qualquer estado $|n\rangle$ do oscilador harmónico, a uma dimensão, temos sempre

$$\langle n|x^2|n\rangle = 0.$$

II (8 valores)

Seja um eletrão no poço de potencial infinito, isto é, $V = 0$ para $0 < x < a$ e $V = \infty$ para $x < 0$ e $x > a$.

1. Suponha que o eletrão no instante $t = 0$ se encontra no estado

$$\psi(x, 0) = Au_1(x) - \frac{1}{\sqrt{2}}u_2(x).$$

onde $u_n(x)$ são as funções próprias do operador Hamiltoniano corretamente normalizadas e A é uma constante real. Determine $|A|$.

2. Calcule o valor médio da energia $\langle E \rangle$ no estado $\psi(x, 0)$. Que acontece a $\langle E \rangle$ quando $t > 0$? Justifique a resposta.
3. Sabendo que para $t = 0$, a probabilidade de encontrar a partícula no intervalo $[0, a/2]$ é maior que $1/2$ determine o sinal de A .
4. Sabe-se que a equação de Schrödinger não tem solução para estados estacionários em que $E < V_{\min}$, onde V_{\min} é o valor mínimo do potencial. Mostre explicitamente que isso se passa para este potencial (poço de potencial infinito). Para isso considere a equação de Schrödinger independente do tempo no intervalo $0 < x < a$ com $E < V_{\min} = 0$ e mostre que não tem solução.

III (8 valores)

Considere o seguinte potencial a uma dimensão ($\lambda' > 0$):

$$V(x) = -\frac{\hbar^2 \lambda'}{2m a} \delta(x) + \begin{cases} \infty & x < -a \\ 0 & x > -a \end{cases}$$

Nas respostas utilize a seguinte convenção para as diferentes regiões do problema:

Região I	$x < -a$
Região II	$-a < x < 0$
Região III	$x > 0$

1. Mostre que a equação para os estados ligados ($E < 0$) neste potencial se escreve

$$\tanh y = \frac{y}{\lambda' - y}$$

onde $y = \sqrt{2m|E|/\hbar^2} a$.

- Há sempre estado(s) ligado(s) para este potencial? Justifique a resposta graficamente.
- Esboce um gráfico da função de onda para o estado fundamental (admitindo que existe).
- Considere agora o problema da difusão nesse potencial, isto é, admita que $E > 0$ e que para $x > 0$ a função de onda é dada por

$$u_{III}(x) = e^{-ikx} + R e^{ikx}$$

Calcule R . Mostre que $|R|^2 = 1$.

- Justifique o resultado da alínea anterior em termos físicos. Para isso calcule o fluxo nas diferentes regiões, I, II e III, e mostre que o fluxo é conservado.

Formulário

- Poço de potencial infinito**

$V = 0$ para $0 < x < a$ e $V = \infty$ para $x < 0$ e $x > a$. As funções próprias do operador Hamiltoniano H (i.e. da energia) são:

$$u_n(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin\left(\frac{n\pi}{a}x\right), \quad E_n = \frac{\pi^2 \hbar^2}{2ma^2} n^2.$$

- Poço de potencial infinito simétrico**

$V = 0$ para $-a/2 < x < a/2$ e $V = \infty$ para $x < -a/2$ e $x > a/2$. As funções próprias do operador Hamiltoniano H (i.e. da energia) são ($n = 1, 2, 3, \dots$):

$$\begin{aligned} u_n^-(x) &= \sqrt{\frac{2}{a}} \sin\left(\frac{2n\pi}{a}x\right) & E_n^- &= E_0 (2n)^2 \\ u_n^+(x) &= \sqrt{\frac{2}{a}} \cos\left[(2n-1)\frac{\pi}{a}x\right] & E_n^+ &= E_0 (2n-1)^2 \end{aligned} \quad E_0 = \frac{\pi^2 \hbar^2}{2ma^2}.$$

- Primitivas para os problemas do poço infinito

$$\int dy \sin^2(y) = \frac{1}{2}y - \frac{1}{4}\sin(2y)$$

$$\int dy \sin(ny) \sin(my) = \frac{1}{2(m-n)} \sin[y(m-n)] - \frac{1}{2(m+n)} \sin[y(m+n)] \quad ; \quad m \neq n$$

$$\int dy y \sin^2(ny) = \frac{y^2}{4} - \frac{\sin(2ny)y}{4n} - \frac{\cos(2ny)}{8n^2}$$

$$\int dy y \sin(ny) \sin(my) = \frac{1}{2} \left(\frac{\cos((m-n)y)}{(m-n)^2} - \frac{\cos((m+n)y)}{(m+n)^2} + \frac{y \sin((m-n)y)}{m-n} - \frac{y \sin((m+n)y)}{m+n} \right) \quad ; \quad m \neq n$$

- Oscilador harmónico: Polinómios de Hermite

As funções próprias são

$$u_n(x) = \left(\frac{m\omega}{\pi\hbar} \right)^{1/4} \frac{1}{\sqrt{2^n n!}} H_n(y) e^{-y^2/2}$$

onde $y = \sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}}x$ e os primeiros polinómios de Hermite são:

$$H_0(y) = 1$$

$$H_1(y) = 2y$$

$$H_2(y) = 4y^2 - 2$$

$$H_3(y) = 8y^3 - 12y$$

$$H_4(y) = 16y^4 - 48y^2 + 12$$

As energias são dadas por

$$E_n = \left(n + \frac{1}{2} \right) \hbar\omega \quad n = 0, 1, 2, 3, \dots$$

- Oscilador harmónico: Operadores A e A^+

$$H = \frac{p^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2 x^2 = \hbar\omega \left(A^+ A + \frac{1}{2} \right)$$

onde

$$A = \sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}}x + i\frac{p}{\sqrt{2m\omega\hbar}}, \quad A^+ = \sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}}x - i\frac{p}{\sqrt{2m\omega\hbar}}$$

com

$$[A, A^+] = 1$$

As relações inversas são

$$x = \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}} (A + A^+), \quad p = -i\sqrt{\frac{\hbar m\omega}{2}} (A - A^+)$$

Os estados corretamente normalizados são

$$|n\rangle = \frac{1}{\sqrt{n!}} (A^+)^n |0\rangle$$

com $A|0\rangle = 0$ e

$$A|n\rangle = \sqrt{n}|n-1\rangle, \quad A^+|n\rangle = \sqrt{n+1}|n+1\rangle$$