Tópicos em Física de Partículas
2 Semestre 1999/2000

Escolha **um** dos temas a seguir propostos. Deverá escrever um pequeno texto sobre o tema que escolher e fazer uma apresentação oral do mesmo perante os colegas numa sessão a organizar em Julho em data a combinar. A duração da apresentação oral será no máximo de 30 minutos.

QED numa gauge não linear

Considere QED com a condição de gauge não linear

$$F = \partial_\mu A^\mu + \frac{\lambda}{2} A_\mu A^\mu \ .$$

1. Escreva $\mathcal{L}_{eff}$ e mostre que $s\mathcal{L}_{eff} = 0$, onde s é o operador de Slavnov.
2. Escreva as regras de Feynman para os vértices e propagadores novos. Calcule ao nível árvore $\gamma + \gamma \to \gamma + \gamma$. Compare com o resultado na gauge linear.
3. Calcule a polarização do vácuo a *1-loop*.
4. Mostre que o diagrama da figura junta potencialmente perigoso para o momento magnético anómalo do electrão não dá contribuição (seria proporcional a λ).



Polarização do vácuo em QCD

Considere a teoria que descreve as interacções dos quarks com os gluões (QCD) descrita pelo Lagrangeano

$$\mathcal{L}_{QCD} = -\frac{1}{4}F^a_{\mu\nu}F^{\mu\nu a} + \sum_{\alpha=1}^{n}\overline{\psi}^\alpha_i(i\not{D} - m_\alpha)_{ij}\psi^\alpha_j$$

onde

$$F^a_{\mu\nu} = \partial_\mu A^a_\nu - \partial_\nu A^a_\mu + g f^{abc} A^b_\mu A^c_\nu$$
$$(D_\mu)_{ij} = \delta_{ij}\partial_\mu - ig\left(\frac{\lambda^a}{2}\right)_{ij} A^a_\mu \ .$$

O índice $\alpha = 1, 2, \ldots, n$ referencia os diferentes *sabores* de quarks (*up*,*down*,...,*top*). Para quantificar a teoria considere a condição de gauge

$$\mathcal{L}_{GF} = -\frac{1}{2\xi}\ (\partial_\mu A^{\mu a})^2 \ ,$$

para a qual resulta o Lagrangeano dos fantasmas

$$\mathcal{L}_G = \partial_\mu\overline{\omega}^a\partial^\mu\omega^a + g f^{abc}\partial^\mu\overline{\omega}^a A^b_\mu\omega^c$$

Para renormalizar a teoria necessitamos do seguinte Lagrangeano de contratermos:

$$\begin{aligned}\Delta\mathcal{L} \ = \ & -\frac{1}{4}(Z_3-1)\left(\partial_\mu A^a_\nu - \partial_\nu A^a_\mu\right)^2 - (Z_4-1)g f^{abc}\partial_\mu A^a_\nu A^{\mu b}A^{\nu c} \\ & -\frac{1}{4}g^2(Z_5-1)f^{abc}f^{ade}A^b_\mu A^c_\nu A^{\mu d}A^{\nu e} + \sum_\alpha (Z_2-1)i\overline{\psi}^\alpha_i\gamma^\mu\partial_\mu\psi^\alpha_i \\ & -\sum_\alpha m_\alpha(Z_{m_\alpha}-1)\overline{\psi}^\alpha_i\psi^\alpha_i + (Z_1-1)g\sum_\alpha\overline{\psi}^\alpha_i\gamma^\mu\left(\frac{\lambda^a}{2}\right)_{ij}\psi^\alpha_j A^a_\mu \\ & +(Z_6-1)\partial_\mu\overline{\omega}^a\partial^\mu\omega^a + (Z_7-1)g f^{abc}\partial^\mu\overline{\omega}^a A^b_\mu\omega^c \ .\end{aligned}$$

1. Verifique a expressão para $\mathcal{L}_G$.
2. Verifique as regras de Feynman dadas no livro.
3. Calcule a polarização do vácuo.

Renormalização da Cromodinâmica Quântica (QCD)

Considere a teoria que descreve as interacções dos quarks com os gluões (QCD) descrita pelo Lagrangeano

$$\mathcal{L}_{QCD} = -\frac{1}{4}F^a_{\mu\nu}F^{\mu\nu a} + \sum_{\alpha=1}^{n}\overline{\psi}^\alpha_i(i\not{D} - m_\alpha)_{ij}\psi^\alpha_j$$

onde

$$F^a_{\mu\nu} = \partial_\mu A^a_\nu - \partial_\nu A^a_\mu + g f^{abc} A^b_\mu A^c_\nu$$
$$(D_\mu)_{ij} = \delta_{ij}\partial_\mu - ig\left(\frac{\lambda^a}{2}\right)_{ij} A^a_\mu \ .$$

O índice $\alpha = 1, 2, \ldots, n$ referencia os diferentes *sabores* de quarks (*up,down,...,top*). Para quantificar a teoria considere a condição de gauge

$$\mathcal{L}_{GF} = -\frac{1}{2\xi}\ (\partial_\mu A^{\mu a})^2 \ ,$$

para a qual resulta o Lagrangeano dos fantasmas

$$\mathcal{L}_G = \partial_\mu\overline{\omega}^a\partial^\mu\omega^a + g f^{abc}\partial^\mu\overline{\omega}^a A^b_\mu\omega^c \ .$$

Para renormalizar a teoria necessitamos do seguinte Lagrangeano de contratermos:

$$\begin{aligned}\Delta\mathcal{L} \ = \ & -\frac{1}{4}(Z_3-1)\left(\partial_\mu A^a_\nu - \partial_\nu A^a_\mu\right)^2 - (Z_4-1)g f^{abc}\partial_\mu A^a_\nu A^{\mu b}A^{\nu c} \\ & -\frac{1}{4}g^2(Z_5-1)f^{abc}f^{ade}A^b_\mu A^c_\nu A^{\mu d}A^{\nu e} + \sum_\alpha (Z_2-1)i\overline{\psi}^\alpha_i\gamma^\mu\partial_\mu\psi^\alpha_i \\ & -\sum_\alpha m_\alpha(Z_{m_\alpha}-1)\overline{\psi}^\alpha_i\psi^\alpha_i + (Z_1-1)g\sum_\alpha\overline{\psi}^\alpha_i\gamma^\mu\left(\frac{\lambda^a}{2}\right)_{ij}\psi^\alpha_j A^a_\mu \\ & +(Z_6-1)\partial_\mu\overline{\omega}^a\partial^\mu\omega^a + (Z_7-1)g f^{abc}\partial^\mu\overline{\omega}^a A^b_\mu\omega^c \ .\end{aligned}$$

1. Mostre que se devem verificar as relações

$$\frac{Z_1}{Z_2} = \frac{Z_4}{Z_3} = \frac{Z_7}{Z_6} = \frac{\sqrt{Z_5}}{\sqrt{Z_3}}$$

2. Calcule Z_1, Z_2, Z_3, Z_4, Z_6 e Z_7 usando subtracção mínima (MS), isto é calcule só a parte divergente dos diagramas. Verifique explicitamente que $Z_1 Z_6 = Z_2 Z_7$.

3. Calcule a contribuição dos fermiões para Z_4 e Z_5. Mostre que estão de acordo com as relações anteriores.

Teorias de Gauge Não Abelianas ao Nível Clássico

1. Mostre que o tensor $F^a_{\mu\nu}$ dos campos de Yang-Mills satisfaz as identidades de Bianchi:

$$D^{ab}_{\mu} F^b_{\rho\sigma} + D^{ab}_{\rho} F^b_{\sigma\mu} + D^{ab}_{\sigma} F^b_{\mu\rho} = 0$$

ou

$$D^{ab}_{\mu} {}^*F^{\mu\nu\ b} = 0$$

onde

$${}^*F^{\mu\nu\ a} = \frac{1}{2}\ \varepsilon^{\mu\nu\rho\sigma} F^a_{\rho\sigma}$$

2. Explique o significado geométrico da Identidades de Bianchi.
Sugestão: Veja o artigo de R.P. Feynman em *Les Houches, Session XXIX, 1976*, North Holland, 1977, Pags: 135-140.

3. Considere a teoria de Yang-Mills (YM) sem matéria.

   (a) Mostre que as eqs. de YM sem matéria se podem escrever na forma

$$\begin{cases} \vec{\nabla} \cdot \vec{E}^a = \rho^a \\ \vec{\nabla} \cdot \vec{B}^a = {}^*\rho^a \\ \vec{\nabla} \times \vec{E}^a = -\frac{\partial \vec{B}^a}{\partial t} + \vec{J}^a \\ \vec{\nabla} \times \vec{B}^a = -\frac{\partial \vec{E}^a}{\partial t} + {}^*\vec{J}^a \end{cases}$$

   calcule ρ^a, ${}^*\rho^a$, $\vec{J}^a$ e ${}^*\vec{J}^a$.

   (b) Mostre que as 4-correntes $j^a_\mu \equiv (\rho^a, \vec{J}^a)$ e ${}^*j^a_\mu \equiv ({}^*\rho^a, {}^*\vec{J}^a)$ são conservadas.

4. Mostre que $\mathrm{Tr}\,({}^*F_{\mu\nu} F^{\mu\nu})$ é uma 4-divergência. Comente sobre a sua inclusão na acção.

5. Mostre que o seguinte *Ansatze* (S. Coleman, Phys. Lett 70B (77), 59)

$$\begin{aligned} A^{1a} &= A^{2a} = 0 \\ A^{0a} &= -A^{3a} = x^1 f^a(x^0 + x^3) + x^2 g^a(x^0 + x^3) \end{aligned} \tag{1}$$

   onde f^a e g^a são funções arbitrárias, são soluções das equações de YM sem matéria. Discuta esta solução.

6. Considere o *Ansatze* de Wu-Yang para soluções estáticas em SU(2) YM.

$$A^{0a} = x^a\ \frac{G(r)}{r^2} \qquad\qquad A^{ia} = \varepsilon^{aij}\ x^j \frac{F(r)}{r^2}$$

   - Deduza as equações a que F e G devem obedecer.

- Mostre que elas são satisfeitas para $F = -1/g$ e $G =$ constante. Mostre que estas soluções correspondem a $\rho^a = {}^*\rho^a = 0$ e $\vec{J}^a = {}^*\vec{J}^a = 0$. ($\rho^a$, ... são definidos no problema 2.14).
- Para as soluções da alínea b) descreva o potencial e os campos e calcule a energia.

Renormalização da Electrodinâmica Escalar

Considere a Electrodinâmica Escalar, isto é a teoria da interacção de fotões com partículas escalares carregadas.

1. Escreva o Lagrangeano para esta teoria.
2. Deduza as regras de Feynman.
3. Identifique os diagramas divergentes.
4. Faça a renormalização das auto energias do fotão e da partícula carregada.

Nota. Para este trabalho é conveniente consultar a nova versão do Apêndice do livro de Introdução à Teoria do Campo que pode ser obtida por `ftp` no seguinte endereço: ftp://porthos.ist.utl.pt/pub/textos/tc1apendice.ps.gz.

Renormalização de QED Supersimétrica

Considere a QED supersimétrica, isto é a teoria da interacção de fotões com electrões e dos seus parceiros supersimétricos, fotino e selectrões.

1. Escreva o Lagrangeano para esta teoria.
2. Deduza as regras de Feynman.
3. Identifique os diagramas divergentes.
4. Calcule a auto energia do selectrão e mostre que as divergências quadráticas cancelam.

Nota. Para este trabalho é conveniente consultar a nova versão do Apêndice do livro de Introdução à Teoria do Campo que pode ser obtida por `ftp` no seguinte endereço: `ftp://porthos.ist.utl.pt/pub/textos/tc1apendice.ps.gz`.

Renormalização do Modelo de Wess-Zumino

Considere o modelo de Wess e Zumino descrito pelo Lagrangiano seguinte

$$\begin{aligned}\mathcal{L} &= \tfrac{1}{2}\partial_\mu A\partial^\mu A + \tfrac{1}{2}\partial_\mu B\partial^\mu B + \frac{i}{2}\overline{\psi}\gamma^\mu\,\partial_\mu\psi - \tfrac{1}{2}m^2A^2 - \tfrac{1}{2}m^2B^2 - \tfrac{1}{2}m\overline{\psi}\psi \\ &\quad -\frac{\lambda^2}{4}\left(A^2+B^2\right)^2 - \frac{m\lambda}{\sqrt{2}}A\left(A^2+B^2\right) - \frac{\lambda}{\sqrt{2}}A\overline{\psi}\psi + \frac{i\lambda}{\sqrt{2}}B\overline{\psi}\gamma_5\psi \qquad (2)\end{aligned}$$

onde o fermião ψ é uma partícula de Majorana e A e B são campos escalares reais.

1. Deduza as regras de Feynman (não esquecer que o fermião é de Majorana).
2. Identifique os diagramas divergentes.
3. Calcule a auto energia do campo escalar e mostre que as divergências quadráticas cancelam.
4. Para renormalizar o modelo é necessário um lagrangeano de contratermos da forma geral

$$\begin{aligned}\Delta\mathcal{L} &= \frac{1}{2}\delta Z_A\partial_\mu A\partial^\mu A + \frac{1}{2}\delta Z_B\partial_\mu B\partial^\mu B + \frac{i}{2}\delta Z_\psi\overline{\psi}\gamma^\mu\,\partial_\mu\psi \\ &\quad -\frac{1}{2}m^2(2\delta Z_m+\delta Z_A)A^2 - \frac{1}{2}m^2(2\delta Z_m+\delta Z_B)B^2 - \frac{1}{2}m(\delta Z_m+\delta Z_\psi)\overline{\psi}\psi \\ &\quad -\frac{\lambda^2}{4}(2\delta Z_\lambda+2\delta Z_A)A^4 - \frac{\lambda^2}{4}(2\delta Z_\lambda+2\delta Z_B)B^4 \\ &\quad -2\frac{\lambda^2}{4}(2\delta Z_\lambda+\delta Z_A+\delta Z_B)A^2B^2 \\ &\quad -\frac{m\lambda}{\sqrt{2}}(\delta Z_m+\delta Z_\lambda+\frac{3}{2}\delta Z_A)A^3 - \frac{m\lambda}{\sqrt{2}}(\delta Z_m+\delta Z_\lambda+\frac{1}{2}\delta Z_A+\delta Z_B)AB^2 \\ &\quad -\frac{\lambda}{\sqrt{2}}(\delta Z_\lambda+\frac{1}{2}\delta Z_A+\delta Z_\psi)A\overline{\psi}\psi + \frac{i\lambda}{\sqrt{2}}(\delta Z_\lambda+\frac{1}{2}\delta Z_B+\delta Z_\psi)B\overline{\psi}\gamma_5\psi\end{aligned}$$

   Mostre que as 6 constantes de renormalização estão todas relacionadas, só há uma independente, uma renormalização da função de onda. Para isso calcule todas as constantes em MS (subtração mínima).

Nota. Para este trabalho é conveniente consultar a nova versão do Apêndice do livro de Introdução à Teoria do Campo que pode ser obtida por `ftp` no seguinte endereço: `ftp://porthos.ist.utl.pt/pub/textos/tc1apendice.ps.gz`.